



ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И БЕРЕМЕННОСТЬ

При отсутствии профилактики частота передачи ВИЧ от матери, живущей с ВИЧ, ребенку во время беременности, родов, родоразрешения или грудного вскармливания составляет от **15% до 45%**




При применении профилактики частота передачи ВИЧ:

- Беременность - **менее 1%**
- Роды - **менее 1%**
- Грудное вскармливание - **отказ от ГВ**, при искусственном вскармливании риска инфицирования ребенка нет


МЕРОПРИЯТИЯ С ЦЕЛЮ ПРОФИЛАКТИКИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ

ВИЧ+ женщины репродуктивного возраста	Беременность	Роды	После родов
<ul style="list-style-type: none">• Ранняя диагностика заболевания• Раннее назначение АРТ,• Достижение неопределяемой ВН,• Обеспечение высокой приверженности лечению• Планирование беременности,• Контрацепция	<ul style="list-style-type: none">• Ранняя постановка на учет• Скрининг на ВИЧ при первом визите• Тестирование партнера• Быстрое назначение лечения (при отсутствии АРТ)• Обеспечение высокой приверженности лечению• Тестирования на ВН перед родами• Цель достижения неопределяемой ВН к родам	<ul style="list-style-type: none">• Проверка сведений о тестировании на ВИЧ• Быстрый тест на ВИЧ в случае отсутствия данных• Выбор способа родоразрешения в зависимости от показателей ВН у женщины перед родами• АРТ в родах	<ul style="list-style-type: none">• Искусственное вскармливание• Ранняя диагностика ВИЧ у младенцев• Назначение ребенку АРВ препаратов, в т.ч. «предварительное лечение»• Обеспечение высокой приверженности лечению у матери• Продолжение АРТ у женщины

АНТЕНАТАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ВИЧ+БЕРЕМЕННЫХ В РФ



ОХВАТ ХИМИОПРОФИЛАКТИКОЙ БЕРЕМЕННЫХ С ВИЧ ИНФЕКЦИЕЙ В РФ



Цель 2026 года:
не менее, чем у 90%
женщин, получающих АРТ,
ВН 50 коп/мл перед
родами



ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА – ПРЕДУПРЕДИТЬ ЗАРАЖЕНИЕ РЕБЕНКА

Главный итог 2024 года
уровень перинатальной передачи
составил рекордные **<1,3%**

